

Iphiclides feisthamelii

  Flambé hispanique, voilier blanc



Duponchel (1832)

Famille : Papilionidae

Sous-famille : Papilioninae



FR - EUR : Préoccupation mineure.




Distribution

Répandu en France dans les Pyrénées, en Espagne et en Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie).

Description

Facilement reconnaissable grâce à ses grandes ailes rectangulaires blanc crème ou jaune très pâle marquées de stries noires transversales, ainsi qu'à ses longues queues.

En Europe, il ne peut être confondu qu'avec le flambé (*Iphiclides podalirius*). En France, les deux espèces cohabitent seulement dans l'Ariège, les Hautes-Pyrénées et l'Aude.



Habitat

Milieus variés jusqu'à 2100 m : lieux broussailleux, escarpements rocheux, lisières.

PH : prunellier (*Prunus spinosa*), cerisier (*P. cerasus*), faux-merisier (*P. malaheb*), pêcher (*P. persica*), amandier (*P. dulcis*), abricotier (*P. armeniaca*), aubépine (*Crataegus monogyna*), et autres rosacées..


Biologie

Vol : univoltin ou bivoltin suivant les régions d'avril à septembre.

Ponte : oeufs pondus isolément ou par paires sur les feuilles des plantes hôtes. Oeuf vert pâle à la ponte qui devient rose orangé par la suite.

Incubation : 1-3 semaines.

Chrysalide : attachée à la tige ou sous une feuille de la plante hôte (entre 20 cm et 2 m de hauteur) par une ceinture de soie. Les chrysalides estivales sont de couleur verte et celles qui hibernent sont de couleur brune.



Biblio

Guide des papillons d'EUR et d'AFN - Tom Tolman & Richard Lewington - 1999 - Delachaux & Niestlé

Les papillons de jour de Fr, BE, LU - Tristan Lafranchis - 2000 - Parthénope

Papillons de France - Tristan Lafranchis - 2014 - Diatheo

Guide des chenilles d'Europe - D.J. Carter & B. Hargreaves - 2012 - Delachaux & Niestlé

Liste rouge des espèces menacées en France - Mars 2012 - UICN & MNHN

© Johann Cousinard 2017