

Aporia crataegi

 Gazé - Piéride de l'aubépine

 Black-veined white


Linnaeus (1758)

Famille : Pieridae

Sous-famille : Pierinae



FR - EUR : Préoccupation mineure.



Distribution


Commun dans presque toute l'Europe, y compris les îles de Lemnos, Lesbos, Chio, Samos, Icarie, Chypre, Rhodes et Sicile. Absent d'Islande, du nord de la Scandinavie, de Corse, Sardaigne et Crète ainsi que des îles Baléares, Ioniennes, et des Cyclades. Disparu d'Angleterre. Répandu également en Afrique du Nord, Turquie, Israël, Jordanie, Liban, Syrie, Iran nord, Irak nord ainsi qu'en Asie jusqu'au Japon (40-70° nord).

Description

Facilement reconnaissable grâce à ses grandes ailes blanches aux nervures noires prononcées.

Le verso des ailes postérieures est suffusé de petites tâches foncées. La coloration des écailles peut tendre sur le jaune clair.

Attention, les individus âgés et les femelles peuvent avoir les ailes translucides.



Habitat

Prairies, pelouses, lisières, haies colonisées par des rosacées arbustives jusqu'à 2000 m.

PH : prunellier (*Prunus spinosa*), prunier (*P. domestica*), merisiers (*P. avium*, *P. padus*, *P. mahaleb*), pêcher (*P. persica*), abricotier (*P. armeniaca*), amandier (*P. dulcis*), aubépines (*Crataegus monogyna*, *C. laevigata*), sorbiers (*Sorbus aria*, *S. domestica*, *S. aucuparia*), amélanchier (*Amelanchier ovalis*).


Biologie

Vol : univoltin de mai à juillet.

Ponte : en paquets au revers des feuilles des rosacées arbustives. Oeuf jaune vif.

Incubation : 2-3 semaines.

Chrysalide : attachée à une tige herbacée ou un rameau.



Biblio

Guide des papillons d'EUR et d'AFN - Tom Tolman & Richard Lewington - 1999 - Delachaux & Niestlé

Les papillons de jour de Fr, BE, LU - Tristan Lafranchis - 2000 - Parthénope

Liste rouge des espèces menacées en France - Mars 2012 - UICN & MNHN

© Johann Cousinard 2014